



advanced care – personal touch

LABO NEWS

Cliniques de l'Europe – Europa Ziekenhuizen

Tel : 02/614.27.80 (site St(e)-Elisabeth) - 02/614.37.80 (site St-Mich(i)el)

N° 48

Diffusion: All doctors, Prescripteurs externes

Date 28/02/2023

Franstalige versie onderaan

Nieuw test-algoritme voor ANCA / MPO / PR3

Geachte collega's,

Vanaf 1 maart 2023 veranderen de RIZIV regels met betrekking tot de ANCA-diagnostiek. Om te voldoen aan deze nieuwe regels en om de laatste internationale aanbevelingen zo goed als mogelijk te volgen, zal de ANCA-test d.m.v. indirecte immunofluorescentie (IIF) niet langer worden uitgevoerd bij verdenking van vasculitis.

In plaats daarvan zullen onmiddellijk de anti-PR3 -en anti-MPO antistoffen worden gedoseerd. Voor de opvolging van vasculitis met gekende anti-MPO of anti-PR3 antistoffen zal alleen de te volgen parameter worden gedoseerd. De IIF ANCA-test blijft wel mogelijk, maar alleen in het kader van andere indicaties, zoals bij patiënten met een vermoeden van een chronische inflammatoire darmaandoening.

De aanvraagformulieren zullen worden aangepast bij de volgende druk. Tot die tijd wordt u verzocht "verdenking van vasculitis: MPO/PR3", "Opvolging MPO" of " Opvolging PR3" op uw aanvraag te vermelden a.u.b..

Indien er niets wordt vermeld, zullen wij de ANCA IIF uitvoeren zonder dosering van MPO/PR3.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het laboratorium.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

De klinisch biologen verantwoordelijk voor auto-immuniteit.

Dr. Julie Jacobs en Mevr. Julie Hotton

Nouveau algorithme de dosage d'ANCA / MPO / PR3

Chers confrères et consœurs,

À partir du 1er mars 2023, les règles INAMI relatives au diagnostic ANCA changent.

Afin de se conformer à ces règles et afin de suivre au mieux les dernières recommandations internationales, le test ANCA par immunofluorescence indirecte (IIF) ne sera plus effectué en cas de suspicion de vascularite.

À la place, les anticorps anti-PR3 et anti-MPO seront directement dosés. Pour le suivi d'une vascularite avec Ac. Anti-MPO ou anti-PR3 connu, seul le paramètre concerné sera dosé.

Le test ANCA par IIF sera toujours possible, mais uniquement dans le cadre d'autres indications, dont la plus connue est pour les patients suspects d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI).

Les bons de demande seront modifiés dès la prochaine impression. Jusqu'à ce moment-là, **merci d'indiquer "suspicion vascularite : MPO/PR3", "suivi MPO" ou "suivi PR3" sur votre demande. Si rien n'est indiqué, nous serons obligés de réaliser le test ANCA par IIF sans dosage de MPO/PR3.**

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le laboratoire.

Merci de votre collaboration.

Les biologistes responsables pour l'auto-immunité au laboratoire.

Dr. Julie Jacobs & Mme Julie Hotton